

어르신

다빈도 복용 약 안내서

꾸준히 먹는 약



때때로 먹는 약



식품의약품안전처



한국의약품안전관리원

꾸준히 먹는 약

고혈압약을 드시고 있나요?

다음의 증상이 약 복용 이후에 새롭게 나타나면
의사나 약사에게 약 부작용인지 확인하세요.



두통



발 부종



기력 저하



어지럼증



두근거림

※ 다음 약과 함께 복용하는 경우 주의하세요.

✔ 코막힘약 ✔ 감기약 ✔ 해열·진통·소염제 ▶ 일시적으로 혈압이 높아질 수 있어요.

꾸준히 먹는 약

당뇨병약을 드시고 있나요?

저혈당은 혼수, 실신 등을 일으킬 수 있어 어르신들에게 매우 위험합니다.
다음의 증상이 나타나면 사탕, 과일주스 등 당분을 즉시 섭취하세요.



피로



떨림



불안



두통



식은 땀



피부 창백



두근거림

※ 다음 약과 함께 복용하는 경우 주의하세요.

- ✔ 고혈압약 ▶ 일부 고혈압약은 혈당을 변화시키기도 해요. 고혈압, 당뇨병을 동시에 앓고 있다면 한 명의 주치의를 정해 진료를 받는 것이 좋아요.

꾸준히 먹는 약



고지혈증약을 드시고 있나요?

근육통이 지속되면
주치의와 상의하여 검사를
받으세요.



근육 피로



근육통

부작용으로 간 손상이 올 수도 있습니다.
다음의 증상이 나타나면 주치의와 상의하세요.



피로



황달



열은 색 대변



갈색 소변

※ 다음 약과 함께 복용하는 경우 주의하세요.

- ✓ 항진균제 (먹는 무좀약) ➡ 먹는 무좀약을 처방받을 때 고지혈증약을 먹고 있다고 의사에게 꼭 알려주세요.



골관절염약을 드시고 있나요?

다음의 증상이 나타나면 의사나 약사에게 약 부작용인지 확인하세요.



구역



식욕부진





복통, 속쓰림



소화불량

장기간 골관절염약을 드시는 어르신은 신기능 확인을 위해 주기적인 혈액 및 소변 검사를 권유받을 수 있어요.



※ 다음 약과 함께 복용하는 경우 주의하세요.

✔ 아스피린
또는 항응고제

➡ 골관절염약과 함께 드시면 출혈이 더 잘 생겨요. 피를 토하거나 변이 검게 나오는 증상이 있으면 의사나 약사에게 알려주세요.



위장약을 드시고 있나요?

다음의 증상이 나타나면
의사나 약사에게 약 부작용인지
확인하세요.

일부 위장약(위산 분비 억제제)을
장기 복용한 환자는
다음과 같은 위험이 증가할 수 있어요.



변비



설사



골절



골다공증

※ 식전 약인지 식후 약인지 확인 후 지시에 따라 복용하세요.




불면증약을 드시고 있나요?

다음의 증상이 나타나면
주치의에게 약 부작용인지
확인하세요.



혼란



방향감각 상실



기억력 감퇴

운전이나 위험한 기계 조작을
하지 않도록 해요.
넘어지면 골절이 생길 수 있어
위험하니 주의하세요.



졸음



넘어짐



어지러움

※ 권장용량을 초과하여 복용해서는 절대로 안돼요.

약 부작용, 병력, 드시는 약을
의사나 약사에게
항상 알리는 습관을 가지세요.

의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청 방법은?

보호자가 대신하여 보고할 수 있습니다.



<https://karp.drugsafe.or.kr>



(14051) 경기도 안양시 동안구 부림로
169번길 30, 5층
한국의약품안전관리원



1644-6223

또는

14-3330



식품의약품안전처



한국의약품안전관리원