

호흡기세포융합바이러스 감염증 알아보기🔍



Q1

호흡기세포융합바이러스 감염증은 무엇인가요?



- ▶ 일반적으로 감기와 유사한 증상을 나타내는 급성 호흡기감염 바이러스로 원인병원체는 호흡기세포융합바이러스(RSV)입니다.

* RSV, respiratory syncytial virus

- ▶ 모든 연령대에서 발생할 수 있으나, 특히 1세 미만 영아에게 나타나는 폐렴 등 하기도 감염의 가장 흔한 원인으로 지목되고 있습니다.

Q2

호흡기세포융합바이러스 감염 증상은 무엇인가요?



- ▶ 호흡기세포융합바이러스 감염증에 감염된 경우 일반적으로 **감염 후 4~6일 이내 증상**이 나타납니다.
- ▶ 성인은 기침, 콧물, 코막힘 등 가벼운 감기증상이 나타나지만, 신생아나 영유아의 경우 **호흡기 증상 없이 보챔, 쳐짐, 수유량감소, 빠르고 쉼쉼거리는 숨소리(천명음), 무호흡(10초이상) 등의 증상**이 나타날 수 있습니다.
- ▶ 특히 신생아 및 영유아는 세기관지염이나 폐렴 등으로 진행될 수 있어 주의가 필요합니다.

Q3

호흡기세포융합바이러스 감염증은 어떻게 전파되나요?



- ▶ 감염된 사람의 기침, 재채기 등 호흡기 비말을 통해 전파되며,
- ▶ 감염된 사람의 분비물 또는 바이러스에 오염된 물건을 접촉한 후 눈, 코, 입 주위등을 만졌을때 감염될 수 있습니다.
- ▶ 특히 집단생활을 하는 산후조리원, 어린이집, 유치원 및 요양기관 등에서 철저한 예방과 관리가 필요합니다.

Q4

호흡기세포융합바이러스 감염증의 치료방법은 무엇인가요?



- ▶ 일반적으로 해열제 투약, 수액 치료 등 대증요법으로 치료합니다.
- ▶ 단, 세기관지염이나 폐렴 등 하기도 감염으로 진행된 경우 입원 치료가 필요합니다.



Q5

호흡기세포융합바이러스 감염증은 어떻게 예방할까요?



30초 이상
흐르는 물에 손씻기



씻지 않은 손으로
눈, 코, 입을 만지지 않기



호흡기증상이 있는 사람과
접촉 피하기



장난감, 식기 등 많이 만지는
물건 자주 소독하기



기침할때
입과 코 가리기



아프면 집에서 쉬기